

FILM 3

Kiedy zrobić test anty-HIV?

1. Kiedy powinno się sprawdzić czy nie doszło do zakażenia wirusem HIV?

Test na HIV powinieneś wykonać gdy w ciągu ostatnich piętnastu lat doszło do zachowań ryzykownych.

Gdy uprawiałeś seks bez prezerwatywy, zażywałeś narkotyki bądź sterydy dożylnie, miałeś transfuzję krwi lub przeszczep.

Zrób test na HIV gdy żyjesz w stałym związku jeśli podejrzewasz swojego partnera o zdradę.

Test na HIV zawsze powinny wykonać kobiety w ciąży.

2. W jakim czasie powinienem zrobić test na HIV?

Najwcześniej test na HIV możesz zrobić **6 tygodni** po niepokojącym Cię wydarzeniu.

Aby w pełni wykluczyć zakażenie wirusem HIV ostatni test przesiewowy w kierunku HIV należy wykonać po **12 tygodniach** (3 miesiącach) od sytuacji, która naraziła Cię na ryzyko zakażenia.

3. Jak działa test na HIV?

Badanie w kierunku HIV nie wykrywa wirusa tylko przeciwciała w twoim organizmie, które próbują go zwalczyć. Po minimum 6 tygodniach od zakażenia wirusem HIV jest ich na tyle dużo by test mógł je wykryć.

Czas od zakażenia wirusem do momentu wytworzenia się przeciwciał anty-HIV, kiedy nie można wykryć wirusa w organizmie, nazywamy **okienkiem serologicznym**.

W przypadku wirusa HIV okienko serologiczne trwa 12 tygodni.

4. Jaki może być wynik testu na HIV?

Wynik testu na HIV może być ujemny (negatywny) lub dodatni (pozytywny)

Test HIV-negatywny – ujemny oznacza, że przeciwciała HIV nie zostały wykryte w organizmie. Jednak nie ma gwarancji, że osoba taka nie została zakażona. Może być potrzebny dłuższy okres, aby zwiększyła się liczba przeciwciał HIV. Test należy wykonać powtórnie po upływie około 6 miesięcy.

Test HIV-pozytywny – dodatni oznacza, że przeciwciała HIV zostały wykryte w organizmie i nastąpiło zakażenie HIV. Osoba taka będzie już zakażona przez całe życie. Pozytywny wynik testu wymaga powtórzenia oraz wykonania testu potwierdzenia.

5. Gdzie mogę wykonać test na HIV?

Badania w kierunku obecności wirusa HIV można wykonać anonimowo.

Krew do badania w kierunku zakażenia HIV może być pobrana w każdej placówce opieki zdrowotnej w Polsce i przesłana do laboratoriów wykonujących badania wstępne i potwierdzające wynik.

Badanie powinno być poprzedzone rozmową z osobą do tego przeszkoloną, która pomoże zrozumieć przebieg zakażenia wirusem HIV.

Jego wynik jest objęty tajemnicą lekarską i służbową.

PODSUMOWANIE

Czy wiesz, że....

Badania w kierunku obecności wirusa HIV można wykonać anonimowo.

Najwcześniej test na HIV możesz zrobić 6 tygodni po niepokojącym Cię wydarzeniu.

Badanie w kierunku HIV nie wykrywa wirusa tylko przeciwciała w twoim organizmie, które próbują go zwalczyć.